Herzlich Willkommen zum Feldtag Bodenfruchtbarkeit

Kalk, Kalzium und pH-Wert
Grundlagen der Bodenfruchtbarkeit

Referent: Max Schmidt
Bodenberatungsdienst

Kalkverluste – Kalkbilanz

Erhaltungskalkung:
15 dt/ha CaO jährlich auf 1/3 der LF

1. Ernteentzüge	Ø 50 kg/ha CaO
2. Auswaschung und Neutralisationsbedarf	300–450 kg/ha CaO
Gesamtverluste	350–500 kg/ha CaO

**NATURKALK –
für gesunden Boden**

Kalkdienst:
9117/1

Kalkverluste durch Auswaschung

nach PFAFF

15jähriger Versuch auf 3 verschiedenen Böden

Böden	Sickerwasser l/m ²	Auswaschung jährlich kg/ha		
		CaO	MgO	Summe
IS	221	338	22	360
sL	216	231	24	255
tL	207	241	25	266
	∅	271	24	295

Parabraunerde aus Löß

Optimaler Bodenzustand
Kalk- und Nährstoffreich
Tiefgründig
Optimale Luft- und
Wasserführung

Feste Bodenbestandteile
50 - 55 %

Porenvolumen
45 – 50 %

Grobporen > 10
15 – 20 %

Mittelporen 0,2-10
15 – 20 %

Nutzbare Feldkapazität
(nFK) 180 – 220 l/m²

Kalkverluste bei der Entwicklung einer Parabraunerde aus Löss in Süddeutschland (Mitteldeutschland, Tschechien, Polen)

Lössanwehung am Ende der letzten Eiszeit mit einem
Gehalt von 15 – 25 % (5 – 15 %) CaCO_3

Kalkmenge berechnet auf 1 m Mächtigkeit ca. 3.000 t
(750 – 2.000 t) CaCO_3/ha

Entbasung des Bodens > 1 m (1 – 2 m)
in 10.000 Jahren

Jährlicher Kalkverlust ca. 300 kg CaCO_3

Pseudogley aus Lösslehm

Kalkverluste in Abhängigkeit von Vegetation und Bewirtschaftung

kg CaO/ha

Geschichtliches zur Kalkdüngung

1. Vorgeschichtlich

Das Mergeln der Kelten (Poseidonios u. a.)

Bereits vor Christus in Gallien die Erkenntnis, dass Böden nur bei regelmäßiger Kalkzufuhr fruchtbar bleiben.

2. Mittelalter

Obwohl viel Wissen verloren gegangen ist, Fortführung dieser Tradition.

Fruchtbarmachung der Böden im Nahbereich der Siedlungen mit Holzasche und Fäkalien (Nürnberger Knoblauchsland)

3. Neuzeit

Mergeln nach Albrecht Thaer um 1810

Melioration mit 100 – 200 t Mergel je ha, ca. 20 t CaCO_3 /ha
Kalkzufuhr durch Kalkdünger und kalkhaltige Stickstoff- und Phosphatdünger (Thomasmehl) im 20. Jahrhundert.

Geschichtliches zur Kalkung

Aus einem Brief des Poseidonios, eines griechischen Universalgelehrten, der im Jahr 58 v. Chr. von Messalia (Marseille) aus Gallien bereiste an seinen Freund Megasthenes:

... ihren beträchtlichen Reichtum verdanken die Kelten einigen nachahmenswerten Methoden der Feldbestellung. So benutzen sie nicht nur organischen Dünger wie Mist, sondern auch mineralischen, z. B. Kalk und verschiedene Arten von Mergel.

Die Moriner an der Nordwestküste Galliens holen solche Erde mit Schiffen aus Britannien und treiben damit einen schwunghaften Handel. Angeblich bleibt ein damit gedüngter Acker bis zu 50 Jahre fruchtbar. Beeindruckt haben mich auch die keltischen Pflüge ... sie haben eine eiserne Pflugschar und Räder, werden von mehreren Ochsen-paaren gezogen und können schwere Böden tief um-brechen ...

In guten Jahren gibt es bei ihnen Getreide in solchem Überfluss, dass man für die kleinste griechische Münze, für einen Obolus, einen halben Zentner Gerste bekommt.

Quelle: aus G-geschichte mit Pfiff 4/82

Das Mergeln nach Albrecht Thaer

Melioration nährstoffarmer saurer Sandböden auf Gut Möglin bei Berlin um 1810

Mergel mit ca. 50% Ton und 10-15% CaCO_3

Aufwandmenge je Hektar 150-200 Tonnen

**Das entspricht einer Kalkmenge von
15-30 Tonnen Kohlensaurem Kalk je Hektar**

Der pH-Wert

Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration in der Bodenlösung.

Das heißt:

pH 5,0 =	10^{-5}	=	0,00001 g H ⁺ -Ionen/l
pH 6,0 =	10^{-6}	=	0,000001 g H ⁺ -Ionen/l
pH 7,0 =	10^{-7}	=	0,0000001 g H ⁺ -Ionen/l

pH 5 ist also 10mal saurer als pH 6 und 100mal saurer als pH 7.

In einem normalen Mineralboden korrelieren die H⁺ Ionen mit den Ca⁺⁺ Ionen. Viele H⁺ Ionen bedeuten wenig Ca⁺⁺ Ionen und umgekehrt.

Einfluss der Kationenbelegung am Austauscher auf die Bodenstruktur

gute Bodenstruktur

durch hohe Ca- und Mg-Sättigung

pH 7

80 % Ca⁺⁺

10 % Mg⁺⁺

5 % K⁺

5 % NH₄⁺

schlechte Bodenstruktur

durch Versauerung

pH 5,5

50 % Ca⁺⁺

5 % Mg⁺⁺

5 % K⁺

5 % NH₄⁺

35 % H⁺

durch Ionen-Ungleichgewicht

pH 6,5

50 % Ca⁺⁺

25 % Mg⁺⁺

10 % K⁺

10 % NH₄⁺

5 % H⁺

Die Pflanzen verbrauchen den Kalk indirekt

Zersetzung der organischen Substanz und Bildung von Kohlensäure durch CO_2 aus der Bodenatmung (Bodenlebewesen)

Ausscheidung von H^+ -Ionen durch die Wurzel

Säurezufuhr durch Ammoniumstickstoff, Harnstoff, Schwefel- und Salpetersäure aus der Düngung .

Saurer Regen

Pufferung durch Kalk oder Versauerung

Bildung von Calciumhydrogencarbonat und von löslichen Salzen, wie Calciumsulfat, -nitrat, -chlorid usw. aus dem Kalkvorrat der Böden und den Calciumionen, die vom Austauscher desorbiert werden.

Folge: Verlust dieses „verbrauchten“ Kalkes durch Auswaschung
Jährliche Kalkverluste 300 – 500 kg CaO pro Hektar

Natürliche Versauerung durch CO₂ aus der Bodenatmung

lockerer Boden

In krümeligen Böden ist der Gasaustausch gewährleistet.

verschlämmter Boden

In verschlammten Böden wird der Gasaustausch behindert und die Bodenversauerung verstärkt.

Kalkwerte wichtiger Düngemittel

Düngemittel	Kalkverlust bzw. -gewinn in kg CaO je 100 kg N (P ₂ O ₅)	
	Acker	Grünland
Stickstoffdünger (% N)		
Kalkammonsalpeter (27)	-58	-36
Schwefels. Ammoniak, SSA (21)	-299	-280
Ammonsulfatsalpeter, ASS (26)	-196	-173
Stickstoffmagnesia (22)	+/- 0	-18
Harnstoff (46)	-100	-80
Kalkstickstoff (21)	+167	+186
Ammonnitrat-Harnstofflösung (28)	-100	-80

Die Kohlensäure im Boden wichtig für

- Mineralverwitterung (Glimmer, Feldspäte)
- Nährstofffreisetzung (Kalium, Kalzium)
- Mineralneubildung (Tonminerale)
- Phosphatmobilisierung (Ca-Phosphate)
- Spurennährstoffmobilisierung
- Aufbau des Karbonatpuffersystems
- $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 - \text{H}_2\text{CO}_3$

Versauerung und Kalziummangel

links: Wachstumsstörungen
in Wintergerste, Herbst 2012

rechts:
Tribschäden und deformierte Wurzel
durch Kalkmangel bei pH 4

Versuch Dürnast
TU Freising

Zuckerrüben

Oben pH 6,5

Unten pH 5,3

Boden verschlämmt,
dichtgelagert, kalt
und sauerstoffarm

Kohlhernie bei Raps, pH-Wert ca. 5,0

Ohne Kalk drohen Ertragsverluste auf stark versauerten Flächen

Quelle: incona, Newsletter Nr. 27 vom 01.07.2007

Der Ausnutzungsgrad der bodenbürtigen Nährstoffe hängt sehr wesentlich vom Boden-pH ab. Mit sinkendem pH-Wert sinkt auch die Verfügbarkeit von Stickstoff, Phosphat und Kali im Boden.

Kalk verbessert die Nährstoffausnutzung Einfluss des Kalkzustandes auf die Verfügbarkeit

Quelle: CELAC; Les Amendements Calciques et Magnesiens

Phosphatgehalte landwirtschaftlich genutzter Böden

Gesamtposphat 150-300 mg/100g Boden
entspricht **4.500-9.000** kg/ha

CAL-lösl. Phosphat 5-40 mg/100g Boden
entspricht **150-1.200** kg/ha

Wasserlösliches Phosphat 1-2 mg/100g Boden
entspricht **30-60** kg/ha

1mg/100g = 10mg/kg = 10g/t = 30kg/ha bei 3.000t Boden/ha

Bodengehalte der wichtigsten P-Fraktionen (%)*)

nach Dr. Kerschberger und Preusker

Bodenarten-Gruppe	Anzahl Versuche	Mittlerer pH-Wert	Bodenphosphatformen ¹⁾			
			leichtlös. P	Al-P	Fe-P	CaP
Sand	5	5,5	3	55	25	17
schwach lehmiger Sand	4	5,6	2	40	40	18
stark lehmiger Sand	2	5,7	2	35	43	20
sandig schluffiger Lehm	5	6,2	2	25	25	48
lehmiger Ton bis Ton	1	7,1	3	20	7	70

*) Summe der vier Fraktionen = 100 % gesetzt

1) Extraktionsmittel löst vorwiegend: NH_4Cl → leichtlös. Phosphate; NH_4F → Al-Phosphate; NaOH → Fe-Phosphate; H_2SO_4 → Ca-Phosphate

Einfluss einer regelmäßigen Kalkung (3 x 15 dt CaO in 8 Jahren) auf pH-Wert und Nährstoffgehalte

U. Hege, LBP München, LW 14/6.4.1985

Versuchsstandort Puch

Die Mobilisierung von 10 mg P₂O₅/100 g Boden entspricht einer Phosphatmenge von 1.500 kg P₂O₅/ha:

Das Einsparungspotential beträgt zur Zeit ca. 2000.-- €/ha

Kosten für die Kalkung:

Branntkalk 550.-- €/ha

Kohlens. Kalk 350.-- €/ha

Nährstoffaufnahme, Protonenabgabe und Nährstoffmobilisierung

Spurenelement Molybdän

Gehalte: Getreide 1 mg/kg TS

Kohl, Leguminosen bis 20 mg/kg TS

Bestandteil des Enzyms Nitrogenase, Schlüssel-
enzym aller N_2 -fixierenden Mikroorganismen

Mo/Fe-Protein Nitratreduktase, katalysiert die
Nitratreduktion $NO_3 \rightarrow NO_2$

Bei Störung blaugrüne Blätter (NO_3 Überschuss)

Beste Verfügbarkeit bei pH 6,5 – 7,5

Humusformen

**Ursachen für die Humusakkumulierung:
zu nass, zu trocken, zu kalt, zu sauer**

Die wichtigsten Eigenschaften der Huminstoffe

Eigenschaften	Fulvosäuren Hymatomelans.	Braunhuminsäuren Grauhuminsäuren
Bildung	in sauren Böden	in basenreichen Böden
Säurecharakter	stark	schwach
Bindung an Tonminerale	gering	hoch (Ton-Humuskomplexe)
C- Gehalt in %	~ 45	bis >60
N-Gehalt in %	0,5 – 2 (4)	bis 8
Stabilität	gering	hoch
Wasserhaltevermögen	gering	hoch
Sorptionsvermögen(KAK)	gering	hoch
Bodentypen	Podsole saure Braunerden	kalkreiche Braunerden Schwarzerden

Humusanteil im Boden

Quelle: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Optimale pH-Bereiche für Bodenorganismen

Bakterien	6 – 9
Pilze	<5,5
Protozoen	6,5 – 7,5
Enchytraiden	5,5 – 7,5
Regenwürmer	6,5 – 8,0

(Stöven, 2002)

Grabgänge des
Lumbricus terrestris
(Tauwurm)

Agrarbetrieb und
Golfpark Kaschow

Bodenprofil nach
Bodenverbesserung mit
Kalk und Kompost

Krümelstruktur durch Ton-Humus-Komplexe

Bei schlechter Struktur ist die Nährstoffaufnahme auf wenige Bereiche beschränkt, so dass ein insgesamt höheres Nährstoffpotenzial vorhanden sein muß.

Eine gute Bodenstruktur ermöglicht eine optimale Durchwurzelung und damit eine gute Ausnutzung der gesamten Nährstoffe.

Aufbau stabiler Bodenkrümel

Ton-Humus-Komplex

**Ca - Brücke zwischen
Ton und Humus**

Voraussetzungen für die Strukturbildung

nach Sekera (Originaltext)

1. Die Primäraggregate müssen wasserbeständig vorgebildet sein, kolloidale mikroskopisch und submikroskopisch kleine Einzelteilchen können von den Mikroorganismen nicht zusammengehalten werden. Je größer und sperriger die Aggregate sind, umso leichter werden sie verbaut. Liegen die Bodenkolloide in peptisierter und beweglicher Form vor, so muss durch eine **Kalk- bzw. Gipsdüngung** der Kalkzustand in Ordnung gebracht und eine **Kolloidausflockung** herbeigeführt werden. Eine Auflösung der Bodenkolloide führt zum Gefügeschwund, d. h. zur Auflösung der Aggregate oder zur Verquellung und Verkittung der Poren, wodurch das Organismenleben gehemmt wird.

Anzustrebendes Bodengefüge

Bodenoberfläche

- Mulchauflage
- offene Bioporen

Oberkrume

- gut aggregiert, locker
- viele tiefreichende Bioporen

Unterkrume

- Aggregate +/- scharfkantig
- etwas kompakt, daher tragfähig
- ausreichende biog. Perforierung
- unauffällige Wurzelverteilung

Krumennaher Unterboden

- etwas kompakt, tragfähig
- ausreichende biog. Perforierung
- unauffällige Wurzelverteilung

Unterboden

- unverdichtet, viele Bioporen

Plattengefüge in einem stark verdichteten Schluffboden

Veränderung wichtiger bodenphysikalischer Kennwerte nach 15 Jahren Kalkanwendung (1978 – 1993). Aufkalkung von pH 5,5 auf pH 6,6 (Quelle: Lehrstuhl für Pflanzenernährung, Gutser TU München)

Ton-Schluff-Trennung führt zur Verschlämmung

pH 7 + freier Kalk
Kartenhausstruktur
der Tonminerale und
Tonhumuskomplexe

freier Kalk

pH 5,0 – 6,5
plattige Struktur
der Tonminerale

pH 5,0 – 6,5
Schluffkruste
Ton ausgewaschen

Starkregen Mai 2013

links:
pH 6,5 bis pH 7

rechts:
pH 6,0 bis pH 6,5

Bodenerosion im Mais

So wirken Kalkdünger

Welche Kalke liefern Ca^{++} -Ionen?

Brantkalk und Mischkalk sofort
Kohlensaure Kalke verzögert je
nach Mahlfeinheit und Reaktivität
(Prädikat leicht umsetzbar!)
(Mahlfeinheitsstufe 1)

Basische Wirksamkeit verschiedener Kalkdünger im Gefäßversuch

nach GUTSER

■ nach 1 Woche ■ nach 10 Wochen

Kalkstreuer mit 12m Streuschnecke

BigBag – die optimale Verpackung für Branntkalk körnig

www.boden-max.de

Kopfkalkung mit Feuchtkalk

www.boden-max.de

AGRAR PRAXISKOMPAKT

Schmidt

Kalkdüngung

Gesunde Ackerböden –
optimale Erträge

100 %
Praxis

3. Auflage

VERLAG

www.boden-max.de

**Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
viel Glück
in Haus und Hof**

Max Schmidt, Mobiltel. 0176/94445690
schmidt@boden-max.de
www.boden-max.de

www.boden-max.de

Beziehung zwischen spezifischer Oberfläche und KAK_{pot} von wichtigen Vertretern des Sorptionskomplexes (Hintermaier, 1997)

Maßnahmen zur Förderung der Regenwurmaktivität

- Optimale Kalkversorgung
- Reduzierte Bodenbearbeitung nach dem Grundsatz: nur so tief wie nötig, so selten wie möglich!
- Reiches Nahrungsangebot auf der Bodenoberfläche
- günstig in der Fruchtfolge: Klee gras oder Raps
- Ungünstig: Mais und Kartoffeln

Voraussetzungen für die Strukturbildung

2. Die Versorgung der Bodenorganismen mit organischer Nahrung muss ausreichend sein. Dies geschieht durch die im Boden erzeugte Wurzelmasse, durch die oberirdischen Pflanzenrückstände und die organische Düngung.

Unzureichende Ernährung der Bodenorganismen hat eine mangelhafte Lebendverbauung und einen Gareschwund zur Folge.

3. Das Bodenklima muss ausgeglichen sein. Es muss getrachtet werden, dem Boden immer eine Bedeckung in Form einer Pflanzendecke oder einer Streuschicht zu geben. Damit wird die Lebendverbauung der Krume vor Regenschlag, Austrocknung und Verwehung geschützt.

Strukturverfall der Ackerkrume

Abb. 9.1: Strukturverfall der Ackerkrume. Nach SEKERA 1951.

Sauerstoff und Wurzelwachstum

lockerer Boden

In krümeligen Böden ist der Gasaustausch gewährleistet.

verschlämmter Boden

In verschlämmten Böden ist der Gasaustausch behindert und das Wurzelwachstum beeinträchtigt.

Änderung der Porengrößenverteilung durch eine Meliorationskalkung

nach Dr. Schuhbauer (in +/- %)

Durchschnitt aus 4 Standorten und 132 Messreihen

	weite Groporen	enge Groporen	Mittelporen	Feinporen
Porengröße	> 0,05 mm	0,05 – 0,01 mm	0,01 – 0,0002mm	< 0,0002 mm
verantwortlich für:	Wasserversickerung Gasaustausch	Wasserversickerung Wasserspeicherung (Wasser leicht verfügbar) Gasaustausch	Wasserspeicherung (Wasser schwer verfügbar)	Totwasser (für Pflanzen nicht verfügbar)
Lebensraum für:	Wurzeln Makroorganismen	Wurzelhaare Pilze Bakterien		
Oberboden	+ 57 %	+ 21 %	- 5 %	- 1 %
Pflugsohle	+ 13 %	+ 53 %	- 5 %	- 2 %
Unterboden	+ 2 %	+ 9 %	- 2 %	- 4 %

Eine gute Kalkversorgung schützt besonders Lößböden vor Verschlämmung und der Erosionswirkung des Wassers

(nach Dr. Schuhbauer)

pH-Wert	freier Kalk	Gefügestabilität (gewogener mittlerer Durchmesser) %	Wasserdurchlässigkeit der Ackerkrume %
6,3	-	100	100
7,0	+	147	263

pH-Wert Veränderungen im Oberboden

Kalkdüngungsversuch Freising/Dürnast (Gutser, 1993)

Bodenart: Lößlehm, Fruchtart: Rüben

Untersuchungsjahr	1987		1990			1993		
	Kalkversorgung							
Kalkversorgung	niedrig	mittel	niedrig	mittel	hoch *)	niedrig	mittel	hoch *)
pH-Wert vor der Saat Probentiefe 0 – 25 cm	5,5	6,3	5,5	6,3	6,9	5,5	6,3	6,9
Differenzierte pH-Wert Messung im Juli								
Tiefe 0 – 4 cm	4,6	5,7	5,1	5,9	6,9	4,7	6,1	6,9

*) zusätzlich 1.000 kg Branntkalk pro Hektar vor der Saat

Ideale Kationenverhältnisse am Austauschcher nach Dr. G. Schmid

Calcium, **80%**; Magnesium, **10 – 15%**; Kalium, **3%**; Natrium, **1%**

Ca : Mg Verhältnis 5 – 8 : 1

Ca : K Verhältnis 25 – 30 : 1

Mg: K Verhältnis 3 – 5 : 1

Kationenverhältnisse verschiedener Böden Bayerns

Kationenverhältnis	Idealboden	Löss-, Kalkverwitterungs-, dilluviale Böden	Pelosole des Trias und Jura in Franken	Urgesteinsverwitterungsböden
Ca : Mg	6 – 8 : 1	5 – 20 : 1	1 – 4 : 1	9- 50 : 1
Ca : K	25 – 30 : 1	20 – 3 : 1	10 – 4 : 1	20 – 4 : 1
Mg : K	3 – 5 : 1	2 – 0,5: 1	3 – 1 : 1	4 – 0,5 : 1

DLG Feldtage Bockerode 2010

Eine Gefährdung für Versauerung und negative Veränderung der Kationen-belegung ist gegeben bei:

- kalk- und tonarmen Standorten
- flacher (keiner) Bodenbearbeitung
- Biogasbetrieben
- intensive Rinderhaltung

Was kann man in jedem Fall tun?

- Kalkversorgung verbessern
- Vorrat an zweiwertigen Kationen aufbauen
- Kalke verwenden, die zweiwertige Kationen (Ca^{++}) liefern

Das Porensystem des Bodens:

- Feinporen ($< 0,2 \mu\text{m}$)
 - Mittelporen ($0,2 - 10 \mu\text{m}$)
 - enge (langsam dränende) Grobporen ($10 - 50 \mu\text{m}$)
 - weite (schnell dränende) Grobporen ($> 50 \mu\text{m}$)
 - Kontinuität der Poren
- wichtig für Luftdurchlässigkeit und Wasserleitfähigkeit
-
- The diagram consists of three vertical bars of different colors and heights on the right side of the slide. From top to bottom: an orange bar labeled 'Totwasser', a blue bar labeled 'nFK', and a cyan bar labeled 'Luftkapazität'. The orange bar is the shortest, the blue bar is medium height, and the cyan bar is the tallest. The labels are positioned to the right of their respective bars.